

Số: /UBND
V/v tình hình rệp xơ bông trắng hại
mía và biện pháp phòng trừ

Minh Hợp, ngày tháng 10 năm 2022

Kính gửi: - Ban cán sự các xóm trồng mía;
- Nhóm trưởng các nhóm mía.

Năm 2022, diện tích cây mía trên toàn huyện là 4.961 ha, nhìn chung cây mía sinh trưởng, phát triển tốt và hiện nay đang ở giai đoạn tích lũy đường. Tuy nhiên, diễn biến thời tiết thời gian qua do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, bão số 4 đang diễn biến phức tạp đã có mưa vừa, mưa to đến rất to và thời tiết nắng mưa xen kẽ, ẩm độ cao là điều kiện thuận lợi cho rệp xơ bông trắng hại mía phát sinh, phát triển và gây hại trên các ruộng mía.

Theo kết quả điều tra của Trung tâm dịch vụ Nông Nghiệp Huyện Quỳnh Hợp vừa qua trên các ruộng mía rệp xơ trắng đã và đang phát sinh gây hại . với tỷ lệ trung bình 35%, cao 10-15%, cục bộ 20-25%. Rệp phát sinh gây hại trên địa bàn các xã: Châu Đình, Châu Thái, Châu Quang, Thọ Hợp, Văn Lợi, Hạ Sơn, Yên Hợp, Đồng Hợp, Minh Hợp, Nghĩa Xuân...với tổng diện tích nhiễm là 542 ha (Trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 497ha. diện tích nhiễm trung bình là 45 ha).

Thực hiện Thông báo số 36/TB-TTĐVNN ngày 06/10/2022 về thông báo tình hình rệp xơ bông trắng hại mía và biện pháp phòng trừ; UBND xã đề nghị Ban cán sự các xóm thông báo và hướng dẫn cho nhân dân biết và có biện pháp phòng trừ rệp xơ bông trắng hại mía như sau:

1. Hướng dẫn bà con nông dân kiểm tra phát hiện các ổ rệp mới phát sinh để ngắt bỏ. tiêu hủy, vệ sinh ruộng mía như bóc bỏ các lá giả tạo độ thông thoáng cho mưa để hạn chế nguồn phát sinh, lây lan của rệp xơ trắng. Đối với diện tích nhiễm rải ở diện hẹp, cục bộ rải rác hướng dẫn bà con đeo găng tay để vuốt rệp hoặc dùng dao kéo cắt bỏ những lá bị rệp hại đem đi tiêu hủy.

2. Tiến hành kiểm tra, phát hiện kịp thời các ổ rệp mới phát sinh để ngắt bỏ đem tiêu hủy.

3. Vệ sinh đồng ruộng: Bóc lá giả để tạo thông thoáng cho ruộng mía, hạn chế sự phát sinh, lây lan của rệp xơ bông trắng.

4. Những diện tích có tỷ lệ nhiễm từ 5% trở lên hướng dẫn bà con tiến hành phun trừ bằng các loại thuốc hóa học như: Sachray 200WP, Nibas 50EC, Goldra 250WG.... Pha theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Lưu ý:

- Phun trừ phải đảm bảo theo nguyên tắc 4 đúng.
- Khi phun cần đảm bảo đủ lượng nước thuốc (24 – 30 lít/500m²) phun ướt và đều trên các lá.
- Sau khi phun lần 1 nếu gặp mưa hoặc rệp còn sót nhiều thì tiến hành phun tiếp lần 2 (cách lần 1 từ 5-7 ngày).

Nhận được Công văn này đề nghị các xóm triển khai kịp thời để nhân dân biết, thực hiện và biết cách để phòng trừ hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, NN.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Vinh Quang