

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ MINH HỢP**

Số: /UBND

V/v theo dõi, phòng trừ sâu, bệnh
hại Cam, quyết thời kỳ cuối vụ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Minh Hợp, ngày tháng năm 2022

Kính gửi:

- Ban cán sự 18 xóm.

Thực hiện Công văn số: 1135/UBND.NN ngày 24/8/2022 của UBND huyện Quỳnh Hợp về việc theo dõi, phòng trừ sâu, bệnh hại Cam thời kỳ cuối vụ.

Hiện nay các diện tích cam kinh doanh đang ở thời kỳ phát triển quả, một số giống cam chín sớm như cam Mát, CS1,... quả bắt đầu chuyển mã. Kết quả theo dõi của cho thấy: Sau đợt mưa lớn trên diện rộng vào đầu tháng 8/2022 trên cây cam (đặc biệt trên giống xã đoàn sớm) đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng rụng quả và có xu hướng gia tăng. Hiện tượng rụng quả trên do các nguyên nhân sinh lý và sâu bệnh hại (bệnh thán thư, bệnh thối nâu quả cam, bệnh thối rễ do nấm,...) gây ra. Dự báo trong thời gian tới khi cam bước vào thời kỳ chuyển mã đến chín ngoài hiện tượng rụng quả do sinh lý thì các đối tượng sâu, bệnh hại chính như ruồi đục quả, ngài chích hút sẽ gia tăng (cao điểm gây hại từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 11); bệnh thán thư, bệnh thối nâu quả, bệnh thối rễ do nấm sẽ phát sinh gây hại nặng, nhất là sau các đợt mưa lớn, mưa kéo dài, gây thiệt hại nghiêm trọng đến năng suất cam nếu không được tổ chức phòng trừ tốt.

Để chủ động phòng chống, giảm thiểu tác hại do sâu, bệnh gây và các điều kiện thời tiết bất lợi gây ra. UBND xã yêu cầu Ban cán sự các xóm tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nông dân, các nhà vườn thực hiện tốt một số biện pháp sau:

- Thực hiện tiêu thoát nước tốt cho vườn cam, tránh không để vườn cam bị ngập úng hay ngập cục bộ sau mưa.

- Không bón phân ngay sau khi mưa (do sau thời gian nắng hạn kéo dài bộ rễ tơ của cây bị tổn thương do nắng nóng dễ gây thối rễ khi gặp mưa) mà cần bổ sung nấm đối kháng Trichoderma, chế phẩm kích thích rễ như Rootwell, axit Humic,... để cây ra rễ mới rồi mới tiến hành chăm bón.

- Dùng túi giấy, vải để bao quả khi quả bắt đầu chuyển mã và thu hoạch kịp thời khi quả chín, không neo quả lâu trên cây.

- Thu gom, tiêu hủy kịp thời những quả bị sâu bệnh hại bằng cách đào hố, rải vôi bột và chôn lấp kỹ.

- Đối với ruồi đục quả: Treo long nảo ở các gốc cam để xua đuổi. Treo các tấm dính có chất dẫn dụ xung quanh vườn để tiêu diệt. Sử dụng Methyl egunon hỗn hợp với thuốc trừ sâu treo thành bẫy quanh vườn để dẫn dụ tiêu diệt trưởng thành đực. Sử dụng hỗn hợp Ento-pro 150DD (100 ml Ento-pro + 1gram thuốc trừ sâu hoạt chất Thiomethoxam + 900 ml nước) phun theo điểm, mỗi điểm phun 50ml hỗn hợp lên 1m² tán (lá) và định kỳ phun 7 ngày/lần.

- Đối với ngài chích hút: Dùng vợt thu bắt và tiêu diệt ngài vào thời gian từ 19 – 22 giờ. Sử dụng túi lưới làm bẫy lồng hom, đầu trên buộc túm, đầu dưới đặt 2 que hình chữ thập để mở rộng miệng bẫy. Đặt mỗi là các loại hoa quả chín có

mùi thơm (chuối, mít, dứa,...) ở giữa 2 thanh hình chữ thập để thu bắt bởi ngài có tập tính bay ngược lên trên sau khi chích hút.

- Đối với những vườn bị rụng quả do nấm cần sử dụng các loại thuốc như: Aliette 80 WG, Insuran 50 WG, NIKO 72 WP, Ridomil gold 68 WG, Amistar 250 SC, Profiler 711.1WG, infinito 687,5 SC,... để tưới quanh tán và phun lên cây theo nồng độ, liều lượng hướng dẫn trên bao bì thuốc.

- Đối với những vườn cây bị rụng quả do mất cân đối về dinh dưỡng: Cần bổ sung phân bón cân đối N:K theo tỷ lệ 1:2, bổ sung thêm Bo, canxi thông qua các sản phẩm như Hi-Boron, NICABO AA,...

UBND xã yêu cầu Ban cán sự 18 xóm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu VT, NN./.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Vinh Quang