

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ MINH HỢP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND
V/v theo dõi phòng trừ sâu bệnh
hại chính trên lúa thời kỳ cuối vụ
Xuân 2023

Minh Hợp, ngày tháng 04 năm 2023

Kính gửi: Ban cán sự Minh Quang, Minh Tiến, Minh Tân,
Minh Cao, Trường Xá, Trung Hồng.

Hiện nay, lúa vụ Xuân đang ở thời kỳ làm đòng - ôm đòng, nhìn chung sinh trưởng, phát triển tốt.

Trong thời gian qua bệnh đạo ôn lá, Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn đã và đang gây hại với tỷ lệ bệnh nơi cao 10 - 15%, cục bộ 25 - 30% số lá (C1,3,5), diện tích nhiễm 25 ha, xóm Minh Quang, Minh Tiến, Minh Tân, Minh Cao, Trường Xá, Trung Hồng.

*** Dự báo thời gian tới:** là thời điểm chuyển mùa nên tình hình thời tiết sẽ diễn biến khó lường, trong thời gian lúa trổ có thể nắng mưa đan xen, ẩm độ không khí cao... thuận lợi cho các đối tượng dịch hại phát sinh và gây hại như: Bệnh đạo ôn cổ bông (trên các giống nhiễm Thiên ưu 8, Thái Xuyên 111, NA2...); Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn,....

Thực hiện công văn số: 492/UBND ngày 6/4/2023 của UBND huyện Quỳnh Hợp về việc theo dõi phòng trừ sâu bệnh hại chính trên lúa thời kỳ cuối vụ Xuân 2023.

Để phòng trừ đạt hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do sâu bệnh gây ra, UBND xã yêu cầu BCS các xóm trồng lúa thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Đối với bệnh đạo ôn cổ bông:

- Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn nông dân chủ động phun phòng bệnh trên những diện tích lúa trổ gặp điều kiện thời tiết bất lợi (trời âm u, nắng mưa đan xen, ẩm độ cao, có sương mù nhiều,...), đặc biệt trên những giống nhiễm (diện tích bị nhiễm đạo ôn lá); Sử dụng một trong các loại thuốc có hoạt chất như: Tricyclazole (Beam 75WP, Kabim 30WP, Folia 525SE, Bankan 600WP,...); Fenoxanil (Katana 20SC, Ninja 35EC,...).

2. Đối với bệnh lem lép hạt:

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chú ý các trà lúa trổ gặp mưa kéo dài, cần phun phòng sớm bằng một trong các loại thuốc: Difenoconazole + Propiconazole (Tilt super 300ND,...); Propiconazole (Tiptop 250 EC, Tilt 250 EC,...); Azoxystrobin + Difenoconazole (Amistar top325 SC,...); Tebuconazole + Trifloxystrobin (Nativo 750WG,...);...

*** Thời điểm phun:** Phun khi lúa trở le te và phun lại lần 2 khi lúa đã trở hoàn toàn nếu điều kiện thời tiết tiếp tục thuận lợi cho bệnh phát sinh gây hại. Khi phun thuốc cần đảm bảo đủ lượng nước tối thiểu 24 lít/sào. Phun vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát để tránh thời điểm lúa đang phơi mao. *Trường hợp lúa trở gặp điều kiện thời tiết khô, nắng nóng không cần thiết phải tổ chức phòng trừ.*

3. Đối với bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn:

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phòng trừ sớm khi bệnh mới xuất hiện hoặc khi phát hiện có giọt dịch vi khuẩn (*vết bệnh chưa hình thành rõ*) đặc biệt là sau các đợt mưa to gió lớn và trên các diện tích hàng năm bị nhiễm bệnh, các giống lúa lai, ruộng lầy thụt, chăm bón thừa đạm... bằng một trong các loại thuốc có hoạt chất như: Oxolinic acid (Starner 20WP,...); Bronopol (Xantoxin 40WP, Totan 200WP,...); Bismethiazol (Xanthomix 20WP,...); Kasugamycin (Kasumin 2SL,...); ... phun theo lượng khuyến cáo và phun lại lần 2 cách 5 - 7 ngày nếu bệnh vẫn tiếp tục phát sinh, phát triển.

*** Lưu ý:** *Tuyệt đối không bón đạm, không sử dụng kích thích sinh trưởng hoặc phân bón lá trên diện tích lúa đã và đang nhiễm bệnh; Sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng.*

Nhận được công văn này UBND xã yêu cầu BCScác xóm trồng lúa tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, chỉ đạo bà con nông dân thực hiện nghiêm túc các nội dung trên.

Nơi nhận:

- 6 xóm;
- Lưu VT, NN./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Vinh Quang